

## RECOMMANDATIONS POST-TRAITEMENT PAR INJECTION

- Après votre traitement par injection, vous pourriez expérimenter une rougeur ou un œdème. Cette réaction devrait normalement durer moins que sept jours.
- Durant les jours qui suivent le traitement, il est conseillé d'éviter l'exposition prolongée au soleil ou au froid, et tant que la rougeur et l'œdème ne se sont pas résorbés.
- Eviter de toucher la région traitée durant au moins les six heures suivant le traitement. Passé ce délai, vous pourrez laver délicatement la zone traitée.
- Eviter l'exercice physique et l'alcool pendant les six heures suivant le traitement.
- Si vous avez déjà souffert d'herpès simplex, l'effraction cutanée provoquée par l'aiguille risque de vous provoquer une récurrence. Parlez-en à votre médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments qui minimiseront le risque de récurrence.
- Prévoir un traitement de maintien avant la résorption complète du produit pourrait optimiser la durabilité du résultat. Renseignez-vous auprès de votre médecin sur ses recommandations quant à la visite de contrôle et au traitement de maintien.
- Une semaine avant votre prochain traitement , éviter de prendre de fortes doses de compléments alimentaires à base de vitamines E, de l'aspirine ainsi que tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien tel que l'ibuprofène. Ces agents pourraient augmenter le risque d'hématomes et de saignement de la région traitée.